

**DISQUISITIONES
DE SINGULTU
IDIOPATHICO ...
FECIT
HYACYNTHUS...**

Giacinto Namias

DISQUISITIONES

DE

SINGULTU IDIOPATHICO

EPUS

ET PRINCIPALIS LACRIMAE IN TUBERCULISMA
AC CILIOBRONCHIA PATIVUM UNIVERSITATE
HUIUS ACADEMIAE PUBLICI JURIS PRIST

HYACINTHUS NAMIAS

IN THEATRO



PATAVII

EX OFFICINA SOCIETATIS TITULI SOCIETATIS

1814

DELECTISSIMIS AMICIS
SOCIETATIBUS TRANSCANTIANIS
PETRO DALLA BALLA
AD
ALOYSIO ZERLOTTO

HYACTYSTHUS NAMIAS

*T*ranscantianum hoc opus mihi tam valde,
quam debiles vires meas concupiscunt. Ut
haurire munus religionis perficerem solam
conscripsi, atque temporis arctuationi limi-
tes, quoniam ad id redigendum necessariam
solertiam ac diuturnam conferrem studium,
impedimento fieri. Itaque quodcumque aliud
ex meo penu deproptum posui quam hoc
adi namque vestro debuisti, nisi meae pro-
motionis die sollemniter auctoritatem nostram
significare voluisset. Primam viles nostras

*hoc simul sancti percurramus; communis
nobis fuit desideria, cogitationes et studia,
neque sine vestro auspicio maximas laureas
honores laete animo adeptos erant. Cuncto-
rum in exiguo hoc mese diligentiae speci-
mine nonnulla saltem facta vobis offero, et
res, quorum ingenia non fictitiae et syste-
mata, sed experimenta observationesque per-
sequantur, plurimis hujusmodi apudculi vitis
saniam, spero, non denegabitur.*

www.cambridge.org/core. University of Cambridge, on 02 Jul 2018 at 12:00:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/9781107305493.014

Quamvis omnium generatim morborum notitia adhuc multis in ambagibus versetur, doctrina tamen systematis vascularis laesionum per scientiarum et potissimum pathologicae anatomiae progressus attingere exerevit, dum quoad systema nervorum priores medicinae instantiores via fese superavit. Morbi rerum systematis vegetantis saepe post agrestantium insectum stimulus, quae observata fuisse, symptomatum causam ostendunt, curricula nonnulla inter limites praefixum saltem percurunt, et phasibus non ita variis productas, ut medicis plurima eorum phaenomena praecognoscere impossibile sit. Ipsa medicae artis cultoribus plerumque perceptum est si ab uno in aliam regionem procedat, et cum ad laetum vergant finem non id improviso fit, sed materiae organicae perturbata formatio paulatim recomponitur, et idoneo temporis spatio, quo virtutae substan-

tiae eliminatur necneque et bonae testibus applicentur, curam restitutio ad contrarium indigere videtur. At in systematis nervosi idiopathiis morbis quoties nullam lucem afferunt necroscopiac! Quae phaenomenorum irregularitas, quae intermissiones, quae exasperationes! Nonne pluries illico destruitur dum aegrotantibus vitam adimere, aut longae ministrari cruciatu videbatur? Si enim physiologicae hujusmodi systematis actiones non intra sensibile temporis spatium perdurant, ita perturbatae studia, quae natura in eisdem aberrationibus constants sequitur, spernere solent. Hinc cum generalia legi statui nequeant, peculiaris facta magis conspicua describere oportet, ut non modo similibus in circumstantiis practicae dirigant, sed etiam germina effundant, ex quibus, progrediente hominum sapientia, principia generalia posteri nostri jacere queant. Inter morbos nervosos singulas profecto idiopathicas, tum propter phaenomena maxime singularia quae ab eo non disjungantur, tum propter abnormem cursum remediaque magis idoneis periculosam oblationem, stu-

dum medicorumque attentionem postulat. Ergo perpendere quae pauca de hoc morbo agnoscantur, et felicis curae auctoritate huiusmodi malo veritate historiam addere non absurdum fortasse consilium iudicabitur.

Si quibus vigeat inter initia ac salutaris tibi gastro-enterici lesionem tanquam proximam singultus causam existimare licebat, incredibile profecto videtur recentiorum nonnullos post tot medicinae progressus non adhuc a propriis scriptis huiusmodi errorem depoliasse. Cum ex aëris in laringem impulsu saepe morbi sensus producantur, singultus vero inspirationis expirationisque momentis respondeat, et nunquam eveniat absque perturbata horum motuum functione, ullum ne dubium alicui esse potest cuius actionibus organi tribuatur? Incipit singultus a magna inspiratione quam diaphragma excitare conspicimus, uti recte animadvertit Hallerus (1), abdominis tumor coarctatur. Sola tamen valida ac subita inspiratio hanc phaenomenon

(1) *Elementa Physiologiae* Linnæus 1766. Tom. III. pag. 311.

nemo explicando non sufficit, cuique enim sine strepitu subito et citae inspirare datum est. Glottidem igitur eo temporis momento contracti, idcirco acron atmosphaerae magna vi absorptum et repulum illius cavi elastice succutendo parietes hujusmodi sonitum efformare videntur. At si pluries ex quacunque tibi intestinalis irritatione singultus excitatur, et interdum etiam supervenit cum per oesophagum alimentorum descensus implicatur, non ex hoc in tubo intestinali singultus easdem proximitas requirendam censuimus? Pituitaria irritatio membranae sternutationem, a valet titillatio vomitum movet; sed nemo propterea hunc utroque aut eam schneiderianae mechanismo ascribere vellet. Ingeniosa experimenta industris Becket (*) quomodo et quantum nervus vagus tum in digestionem cum in respirationem influat, evicere, et probabiliter ope possimum hujusce nervi inter tubum intestinales atque organa respirationi inservientia ea su-

—————

(*) *Recherches expérimentales sur les fonctions du système nerveux sympathique.*

strictur sympathia, qua irritatione tibi gastro-enterici laborantes saepe singulis affligantur. At non morbo hujusce usus organi singulas cietur; et medullae spinalis irritationi, teste Branning (1), aliorumve organorum (2) lesionibus pluries tribuendas fuit. Tamen vere omnibus in hiis causis morbum, uti dicunt, essentialem non efformat, lesionem enim tibi intestinalis aut hepatis aut aegrotantis cujuscuque organi symptoma est, ejusque descriptio ad singularem eorundem morborum historiam spectat. Mihi de singulis pertractare in animo est, qui, cum ab omni alia pathologica conditione sejunctus sit, existimandas revera idiopathicas, atque admodum generatas a peculiari perturbationis ratione nervorum ad organa respiratoria pertinentium. Ejusmodi historiae morbi parum lucis attulit pathologica anatomia; perire enim illis effectus tantam efficientiae habent in animalem economiam, ut vitam extinguere valeant. Unum

(1) Haller, Op. cit. Tom. III. pag. 314.

(2) Bartsch, *Separationes aut Anatomia practica etc.* Lugduni 1760. Tom. II. pag. 23-44.

exemplum aucti a Galileo vice Robt. Moreau (1) jam prolatum, in quo singulae lesae degenerationi adjungebatur, ac subinde letalis evasit, sed in eadaveris dissectione integra omnia viscera reperiuntur. Probabiliter in singula parte nervosa, ut in caeteris idiopathiis nervosis, subtiliter, quam cultum anatomicum penetrare quærit, morbum conditio inquisitiones nostras effugiet.

Typus hujusmodi singulus nunc continens, nunc intermittens est. Josephus Frank (2) diligentem exposuit historiam virginis 17 annorum, quam diu nocturne per octo circiter menses vehemens singultus exercebat. Cum vero intermittens sit, sæpe irregularibus proditur accessibus. Interdum nocturno dumtaxat invadit tempore, ut in virgine de qua loquitur Hoffmannus (3), quæque, si ab accedentibus excitabatur et corpus ipsius

NOTÆ AD NOTAS PRÆCEDENTES

(1) *Dictionnaire des Sciences médicales*. Paris 1807. Tom. XXI. pag. 516.

(2) *Ante-Natali Clinici Tractatus*. Vindobæ 1799. Pars II. pag. 141.

(3) *Medicina systematica*. Vindobæ 1736. Tom. IV. Pars III. pag. 104.

in lecto loco moriebatur, cessabat singultus, neque usquam per diem incidit, quamvis saepius epulla segra nimiam indaberis. Nonnulli contra recenset solummodo eam vigilis rursus, uti in vetula de qua Thomae (1), Bartolissio scripsit Georgius Segerus Thuronensis. Haec, quam ojus pagi licoles obsecram iudicabant, a biennio semper et acriter singultiebat, sed nocte inter dormieadum ex toto sedabatur. Animadvertit praeterea Segerus hunc singultum inter loquendum intermittere, deis velociorem redire neque ac si quod intermissum fuerat, esset resarciendum. Invenire in praesentia saltem puellam quatuordecim circiter annos natam, quae singulta hanc ipsam rationem sequente a quatuor integris mensibus misere liberat. Exempla tandem singultus periodici (2) non deficient, et Bonetus (3) in Sepulchreto de virgine loquitur, quae fore quotannis co-

—————

(1) Thomas Bartolissii Centurio III. Epist. LXI. De muliere singultiva. Hagae Comitum 1740.

(2) *Élat. des névroses individuelles*. Tom. III. pag. 148.

(3) Tom. II. pag. 42.

dem plerumque tempore a pertinaci singulto non, nisi in vomos, per circiter quatuordecim dies libera erat. Ex hinc factis plurimisque aliis ab auctoribus collectis arguere licet, quam incertis temporis finibus hujusmodi morbus circumscribatur. Sit satis dicere usque annos viginti quatuor ⁽¹⁾ persistisse.

Concessio quam abnormis hic motus gigni in epigastrio ac in hypochondriâ lumbi- tudinis opprobriosisque sententia persaepe affert; interdum vero vomitum exolat, uti in eam narrato a medico Dominico Gola ⁽²⁾ singulis a tridecim mensibus perdurantia, qui toties inter alia accensum morebatur vehementissimus, quoties alimenta in ventriculum degrediebantur, ac plerumque eorum vomitionem ciebat. Caetera vero abnormis phaenomena in historia hujusce morbi notata non jam illius effectus meo judicio sunt sentienda, sed conditioni depravatae sen-

(1) *Josephi Fossii Francoe medicinae universae praeceptorum*. Turisii 1805. Pars II. Vol. VIII. pag. 33.

(2) *Annali Universali di Medicina*. Vol. XXVIII. pagine 189.

afflictis ipsam singultum sustinentis ac per totum systema nervosum diffusae profecto referenda. Hic historiae Josephi Frank⁽¹⁾ recenseri meretur laevi dolor pectoris inter quistum et scissum et veris costis, nec non cephalica abdominisque dolores, qui aegrotam interdum vexarent. Puella singultientia quam nunc observo, et de qua superius locutus sum, dolorem novissimis hinc diebus in eadem pectoris regione accusat, qui topicis sedantibus non adhuc mitigatus est. Singultus in ista puella per primos menses sine altero symptmate duravit, sed decem abhinc diebus continui omnium artuum tremores illam aggressi sunt, qui dumtaxat in somno cessante singultu cessant, et cum illo simul ac aegritas experscitur, iterum concitantur. Quibus omnibus nuper praedictus dolor pectoris eandem rationem ac caetera phaenomena persequens adjectus fuit. Nunquam vero alias obtinuit, ut hujusmodi morbus magis insolentes ac viros effectus per-

(1) Vol. cit. *Act. Medico-Chir. etc.*

apiciculos exhiberet, quam in eo casu, de quo meminit Hellis (1) medicus nosocomii Rothomagi. In hoc aures acutius a dorso in epigastrium extendebatur et singultus appareret, qui, dum aures totum corpus pervadebat, obdurebat, hac vero ad dorsum redeunte cessare solebat. At si, ubi haec aures ad manum alterius articulum pervenerat, super eum articulum flectebat illico singultus suspendebatur, et durante flexione aiebat. Cessata vero flexione, illico renascebatur. Singularia porro omnia illius histocist phaenomena hic referre supervacaneum foret, de qua ita hoc tantum dicam magnopere distare longeque recedere ab illis, quae in animali oeconomia agnoscebantur.

Causae omnes, quae sunt innumerae, systema nervosum perturbantes idiopathice parere singulum observatae fuerunt; ac mirandum profecto est absque ulla manifesta potestiarum nocentium actione hunc morbum interdum crisi et perricacem durare. Ita evenit jam supra memoratae puellae,

www.biodidactic.com/revista-vra

(1) *Archiv. Clin. Chir.* Vol. XLIV pag. 586.

quam adhuc video medicorum attentione studiisque dignissimam. Inter alias causas imitationis viro, cujus tanta est efficacia ut etiam epilepsiam progignere possit, dumtaxat recordabor: nimirum licet exemplum (1) proferre quatuor puellarum in nosocomio apud singulicentem decumbentium, quas singulae post tertium diem singuliter carperunt. Non ego quomodo ad singularem parientium hujusmodi causae in fibras nervosam agant satisfactis erit, intima enim exteriorum agnitionem cum corpore humano relatio deasae caligine adhuc obducitur, neque si nova hypothetica, post tot erecta et diruta, aedificia canderem, melius ex illis resistentis mysteria naturae perspicerentur, quam solis observationibus ac experimentis debellare datum est.

In tanta causarum ambiguitate et symptomatum inconstentia quomodo dubia sit methodus curationis neminem laebet. Deficit in singula pariter ac plurimis nervorum in mor-

(1) Sauvages, *Encyclopædia methodica* Venetis 1765, pagina 396.

hic coarctata inter causas symptomata immediate necesse, qui, ut petapicodistimus noster Bufalini docuit, medicinam quidem efficacem consistit. Si causa forte nociver illam cito amovere, quoties hoc concedatur, praecipua est indicatio; sed si, quod crebro contingit, vel ignoretur, vel causa ipsa remota morbos incrudescit, ad quae pharmaca confugiendum? At si salutari ea praesto sunt medicamina, quae nervorum quoque morbos expugnant, sed ex eorum multitudine cui potissimum in singulo morbo fidendum non definitur, nimiaque divitiarum copia scientia opprimitur. Haec probabilis est omnia pharmaca, quae sub antiepileptico nomine veniunt, eadem facultate variare ejusdem facultatis gradibus pollere, neque multiplices nervorum idiopathicos morbos, qui absque nota causa vel hac subdita perdurant, unam atque eandem habere naturam judico. Igitur in his praesentibus a juvenilibus et laetentibus criterium sumere oportet, quo caute omnia hujusmodi medicamina explorentur, donec reperiantur quod aut valitudinem afferat, aut saltem angustis modum imponat.

Ita etiam agendum arbitror in singulis, cuius-
 nam forte periodicus sit. Namque si pe-
 riodicum accensūgia facillime discutitur, ut
 in casibus a scientiarum medicarum liti-
 ce (1) relatis. Memoratu dignissima est hi-
 storia, quam Jaurion (2) edidit de singulis
 periodico post menstruum suppressionem.
 Præquam emmenorheæ tolleretur, cortex
 peruvianus adhibitus est, sed frustra, cur-
 su vero catameniorum restituta illius non
 singularem radicem erulit. An non equi-
 dem, si quæ analogæ facta colligerentur, neu-
 tiquam specificis causis in fibram agentibus
 destruendis, sed ipsius fibræ læsiones a po-
 tentiis nocentibus relictas discutiendo mor-
 bos periodicæ formæ dissipare remedia ac-
 censūgia extenderetur? Sed singulis pe-
 riodici frequentes casus non sunt, ne in
 pluribus post cessatum amctionem, vel igno-
 ta ejus causa, distarcus perdurat. Tunc re-
 vellentia atque antispasmodica experienda,

—————

(1) Vid. cit. pag. 559.

(2) Id. vid. quædam hinc pag. 553.

48

ut quod aliquo saltem temporis spatio morbosam motum coercent tandem desegnat. Cum hoc vero acciderit, in eo pharmaco inspicendum, quoniam idiosyncrasia singulorum, ut ceteri aetiorum morbi, saepe a consuetudine relictus, et si quod remedium ad corrigendos anomalias illius aegritudinis valuerit, interdum morbosam phaenomenon non amplius apparet, atque radicitus curatum fuit. Huiusmodi therapiae, historia singulas sororis meae, quam nunc referam, exemplum sane locuturum exhibebit.

Soror mea annos undecim nata, temperamento lymphatico-sanguineo praedita, summoque sensilitatis imperio, plurimos morbos prima aetate subit. Iterum ac tertio angina stridula in vitae periculum venit, diatesisque strumosa incipiente dies laboravit. Opportuna remedia integram illi sanitatem reddere, verumtamen in atmosphaerae viciisculis affectiones et rheumatismo saepe passa est. Noctu interdum doloribus in genuum articulatione affligebatur, qui pariter rheumatici scintillae forent, et sponte cedebant. Vere praesentito post saburram gastri-

eam nonnullorumque purgantium usum crebrius ructibus, quos singulis sequebatur, erodari cepit. Singulis vero saepissime abique ructibus penetrabat neque dum accessio resolvebatur. Vespertino praesertim laborabat tempore, horaque circiter nona ructus singultusque incipiebant, qui nunquam, nisi duobus tribusve horis praeterlapsis, cum aegra sermo tandem sopita erat, intermittebant. Interdum frequenter, ac potissimum mane, illa corripiebatur, sed neque vehementes erant, neque multum indolebant. Sub ructibus singultibusque aliquid acidi in os ascendere aegra testabatur, imo nunquam sapor acidus eam decebat. Pulsus et sermo a conditione normali non recedebant, linguaque rix albida, venter mollis, neque ad pressionem dolens, coarctata alimentorum appetentia, bonus aegrotantis aspectus, obtuli gastro-enterici phlogosia vel suppuratio subitum singultum non persistere demonstravit. Caetera omnia organa sana apparebant, quare singultus idiopathicus existimatus fuit, eoque magis, quo morbi typus ejusque circumstantiae (intermissio potissi-

nam singulis si quid agra intento animo perpendebat, promptaque accensus apparitio occasione fortis edaris ex. gr. *di pipa*) ad systematis nervosi laesiones evidentissimas pertinebant. Nervorum innata mobilitas huius morbo agram praeparavisse, aburnaeque gastricae catarticoorumque perturbatio ad illius productionem agiae videbatur. Praestantissimus ideo et doctissimus magister meus Doctor Trois, qui benigne huiusmodi curam suscepit, parvis magnaeque potae doses cum bismuthi magisterio praescripsit. Hoc valido antispasmodico morbum praecipuum moderare, magnesia vero aburnae, si quas adhuc remaneret, blande dissipare, gastricaeque acidos, qui saepe singulorum nervorum dispositioni occasiones praebeissent, inflammare coabatur. Cum per multos dies in illis praesqueretur, sapor acidus rictusque evanescere; ad singulos minime mitigatur, imo illius accensus frequentiores se accensis fieri sunt. Frustra morphina ipsaque opium, frustra aqua colobata leni-oro-craai, frustra assae foetidae elymata adhibentur; morbus periculosissimus prosequi-

batur, jamque egregie constitutionem labefaciebat. Altera hebdomada fecerat periergrum ex quo affligebatur, cum noctu ad temperandum violentissimum longissimamque accensum rubescere epigastri et hypochondriorum cutem deliberavimus. Sinapis emplastra eliguntur, et (mirabile dictu) vix vix aliqua sensationem ex sinapismo percipere, neque adhuc cutis rubescebat, et tamen singulis omnino sileat. Mane rursus apparuit, sed eodem auxilio statim discussus fuit. Cum diuturnior acriorque esset reaperitus accensus, qui fore semper eodem hora incipiebat, curavi ut ante id tempus sinapismum applicarentur, atque ita pluries mihi licuit illius ortum cohibere. Cæteris vero diei horis singulis de more persistit, singulisque vespertis quibus aut propter nimiam cutis lesionem, aut quacunque alia ex causa remedium negligebatur, vespertinus accensus consuevit debacchabatur. Factum est sæpenumero ut ferens singulis rheumatismum tibiarum dolor de more inurgeret, quo insurgente singulis illico sileat, consuevit vero consuetum decursum resume-

ret. Hujusmodi metamorphoses interdum una nocte saepissime se alternis vicibus mutare. Poero observatione dignissimum erat percipere quanta promptitudine ipsae intellectuales impressiones externaque levitas abnormem motum exhiberent, atque hujusmodi casus revulsionis effectuum mirabile exemplum offerret. Animalis oeconomiae suprema lex est impressionem praëponderantem in aliquam systematis nervosi partem, tanquam si ad illam totam vitalis efficientiae reactionem provocaret, impedire quominus in ceteris reactio ipsa distribueretur. Ita historici medicae de homine vetusto loquuntur, qui dum se crucifixi nullum dedit doloris indicium, pariterque ego vidi in Clinico Patavino Insituto theomanicum, quae sub ictibus iisdemque vulncribus nullum se pati dolorem ostendebat. Neque existimanda erat mulier sensationibus incepta, vix enim sacram imaginem illi admoveere statim religionis gratias verbaque fecit. Eadem ratione Gallus Sabatier in opere cui titulus *Les lois de la révulsion dirigées sous le rapport physiologique et thérapeutique*, -

plurima (*) refert exempla stomacorum irritantium, quae nullos in eorum prodixerunt effectus, cum unum alterutro organon irritationis processu laborabat. Et omnes praeter medicos libri abundant factis supremam hanc legem demonstrantibus, quae facillime impressionibus irritationes morbosas tollere aut imminuere datum est. Si vero in eam aetatis meae ad compescendum singultum et levissima impressio sufficiebat, hoc factum judico ex parte irritationis morbosum motum efficiente (qui hinc etiam propter solam consuetudinem persistebat); sicut enim in histociae progressu apparet, externae irritationes aucto interna fomite non illam amplius coercere poterant. Sed rubefaciendum impressio etiam cum valida erat non nisi per tres quatuorve horas aegrotam a singulis protegibat, quare elapso hoc tempore accessus renascebatur. Si temporariam constrictionem temporaria revulsio producebat, ex permanente permanentem fieri posse judicavimus, ideoque revulsorium ad

—————

(*) Pag. 19-20

epigastrii regionem praescrupimus. Eventus
 spei respondit; post enim vesicatorii appli-
 cationem octo integris diebus neque una
 singultus apparuit, et morbus ex toto proli-
 gatus consistebat. Sed nona die abque causa
 manifesta eodem more quam prius renascenti.
 Experiri volui si adhuc singultui ad hypo-
 chondria cum coarctis posset, quod illico
 non aliter ac in caeteris accessibus, evenit.
 Vesicatorium tunc inutile evasit, quoniam
 morbus de consueta via non divertebat, et
 solis singultui cum moderate concedeba-
 tur. Sed cur vesicatorium per octo dies
 singultum compescuit, nonaque beneficium
 amisit virtutem, cui non minus solus ex-
 asperatus esset? Cur quod amplius efficere
 haec revulsio nequebat singultuum revul-
 sio illico efficit? Ex observationibus constat
 solitarum impetuum effectum extenuari,
 eundemque constantem dolorem propriam
 aciem obrundere. Quid ergo mirum libram
 octo praeteritis diebus a solita vesicatorii
 impressione minus fuisse excitatam, ac inde
 impetuosam morbosam praevalescere, quae,
 ipsa frustranea revulsione, singultum rego-

asserit? Nonne parva opti dosis primis diebus spasmus idoneos sedans diebus venientibus non nisi quantitate majore idem beneficium absolvis, et nonne saepe illius preparationes mentare necesse est? Ita factum est in historia quam expono; sinapismi enim statim obtinuerunt quod ordinaria vesicatorii impressio obtinere non valebat, libraque vero, mea sententia, non sinapismorum actionibus tam promptis asserit, quia neque eorum applicatio erat continua, neque semper super eadem regione ponebatur. Sinapismi tamen morbum radicitus non tollebant, eiusque totam curam confidere non congruum videbatur. Usus ideo glaciis interitus experti sumus quas accessus poriter continebat, sed pervicacem singultum eradicare nequivit. Dum furente accessu supra glaciis frustula in ore tenebat, continuo singultuosus motus cohibebatur; qui vero resurgebat, si per quinque secundo minuta huiusmodi remedium deserebatur. Itaque glacies eundem effectum, minus tamen disturbatum quem rebofacientia producebat. Illius actio nimiam nervorum mobilitatem coercere videbatur,

quae vero consta caloris dispersione iterum apparet. Post ichdomadam per quam accessus ante glaciem ante sinapiensis mitigabatur, evenit nunc quod neque hi neque altera efficere accessum valere possent. Alvina dejectio, in qua duo lombricoides exires, causam forte ostendit promptae accubaeque mutationis. Judicavit praedilectissima Magister meus, judicavi et ego veritas in tubo intestinali evolutas morbosam impressionem in nervos ad organa respicientia pertinentes (tam stricto fiedere illis tubi gastro-enterici junctis) augere, propterque illis super sinapismorum impressionibus praedominium horum auxilium desit; glaciem vero non valere ad moderandam et terminandam irritationem non auctam nervorum mobilitatem. Eventus opinioem comprobavit; suppeditatis enim antelminticis, novi lombricoides emissi sunt, et post eorum exclusionem statim sinapiensis glaciesque consuetam adjumentum atralere. In respicientem non ventura vermes ex toto digestum producere, neque eadem ulterius antelminticorum usus profuit, neque illam

vermicationis phenomenon existeret. Spasmodic diaphragmatic contractiones ipsamque perturbatam nervorum oeconomicam functionem intestinales vitasse, quo vitio vermes evoluti, uti in pueris post operationes chirurgicas evolvuntur, sane credidimus. Vermibus eliminatis, nulla singulis manifesta causa existente, ab morbosam nervorum consuetudinem persistere putavimus, quam aequal in ipsis physiologicis functionibus hujusmodi systema natum est. Nonne verum si edere aut dormire data haec consueverimus, ea constanter fane vel somno gravamur? Ut vero haec consuetudo evelleretur glacie et sinapiis utrumqueque singulis accorum praeverire deliberatum fuit, atque ita alternis vicibus haec remedia adhibita sunt, ut per octo decem dies omnis morbus sedatus fuerit. Tunc medicamentum novum nuntiabil retinimus, ac tandem, cum firmissima nobis visa est valetudo, crasine ea dederimus. Aquam foetidam ferrique carbonem ad corroborandam constitutionem atque immiscendam nervorum mobilitatem deinde praescripsimus, sororque mea ab illo

ad

tempore neque ad praesens non amplius huiusmodi morbo laboravit, cui aetate praeterlapsa græpe, qui Venetiis epidemice grassatus est, tam graviter affligerit.

In cunctis huiusmodi sequentes circumstantiae conspicuae sunt:

1. Nulla causa nota idiopathici singultus, qui a priori et etiam a posteriori, ob therapiam quae sanitatem reddidit, vix est persistere ex more consuetudinis systematis nervosi.

2. Celeritas, qua intellectuales impressiones, dolores, revelluntque ad eam applicata abnormem motum faciebant. Tam prompta revellens aetio probabiliter a parva irritatione singulum resiliens nascebatur.

3. Nulla revellens efficacia dum interna irritatio ex fortuita remium evolutione agebatur.

4. Ventratori ad epigastrum impendo, quae singulum per octo dies haerens, ac deinde cum fibra illi assueverit, neque temporariam siapismorum emolumentum affert valuit.

5. Glaciel vires, quae per minus temporis spatium quam sinapismi angustas accessum compecebant. Durante vermium irritatione neque ex glacie ordinaria auxilium percipiebatur.

6. Benefici tandem externorum irritantia et glacie effectus, quorum continua admotio, cum per octo dies singularem emolno cohibuerit, morbosam nervorum consuetudinem extinxit, et aegrum ad pristinum sanitatem restituit.

THESES

————

I.

*Cortex peruviana, ejusque præparatio-
nes, non tantum propter vimque qua possunt
facultates, quantum specificam propter actio-
nem periodicam ferre morbos discutiant.*

II.

*Non quoties turgida vasa in cadaverum
dissectionibus reperiuntur, toties de progres-
sa phlogosi arguere licet.*

III.

*Experimenta in vivis animales, quæque
pathologicae observationes summarè phy-
siologice præcipuum æquivalent.*

IV.

*Quæ mollior corporis textura, eo sub ini-
micarum actionum efficientia ad resolutio-
nem prout est.*

V.

*Sanguinis coctura non constans inflam-
mationem indicare judicanda.*

FI.

Ad explicandam celeritatem, qua nonnullae substantiae ingentes per urinas excremantur, notas circulationis vias sufficiunt, neque canales a tubo gastro-enterico ad apparatus ure-papillarem directos antea effugere deest.

FII.

Leges omnes corporis animalis cum sanitas aegrotantis plurimas subeant exceptiones, adeo cum individuarum praedispositiones discrepant, ut eadem causa crebro effectus maxime diversos producat.

FIII.

In quibus morbis organicis non semis verborum phaenomena materiali locismi in cadaveris dissectione detectae tribui possunt. Eandem laesionem interdum in alteris cadaveribus reperiuntur, praeterquam quod durante vita eodem phaenomena aut alia quaecumque morbos animadversus essent.

IX.

In curandis hominum morbis salubres naturae vires magis facere oportet.

X.

Si in morborum processu quidam medici nunquam crisi se animadvertere ac dignoscere affirmant, hoc profecto ex eorum tumultuaria curatione oritur, quod morbi cursus perturbatur, vixque vitales reactiones plane compescuntur.

XI.

Ad componendas chronicas aegrotationes fere semper non unum, sed plura elementa morboſa concurrant.

XII.

Ergo in eorum curatione neutiquam una est potest indicatio; quodvis enim elementum peculiarem ac propriam indicationem exhibet.

